



## **Feinnadel-Aspirationspunktion der Schilddrüse** **(Patienteninformation und -verständnis)**

Kopie  
erhalten

Patient: \_\_\_\_\_

geb. \_\_\_\_\_

Adresse: \_\_\_\_\_

Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient,

Ihnen wurde eine Feinnadelpunktion der Schilddrüse aufgrund folgenden Befundes empfohlen:

- szintigraphisch kalter Schilddrüsenknoten
- sonographisch auffälliger Schilddrüsenknoten
- tastbarer Knoten
- Schilddrüsenentzündung
- andere Diagnose: \_\_\_\_\_

Die Feinnadelpunktion, durchgeführt mit einer sehr dünnen Nadel, ist eine einfache Untersuchungsmethode. Sie liegen hierbei auf der Ultraschall-Liege. Die Punktion dauert nur wenige Sekunden. Nach der Punktion müssen Sie die Punktionsstelle mit einem Tupfer noch wenige Minuten abdrücken, nach Punktion größerer Zysten erfolgt dies ggf. über einen längeren Zeitraum.

Die mikroskopische Zelluntersuchung im Labor (Institut für Pathologie) kann bis zu 2 Wochen dauern. Seien Sie also nicht beunruhigt, wenn der zytologische Befundbericht zu Ihrer Punktion erst später eintrifft. Die Bewertung einzelner Zellen nach einer Feinnadel-Aspiration darf aber nicht mit einer endgültigen Diagnose gleichgesetzt werden, sondern es bedarf einer zusammenfassenden Bewertung aller diagnostischen Verfahren.

### Wann ist eine Feinnadelpunktion angeraten?

Punktiert werden sonographisch oder szintigraphisch verdächtige Knoten, ggf. auch bei Verdacht auf Schilddrüsenentzündung. Schilddrüsenzysten können zur Entlastung punktiert werden. In szintigraphisch "kalten Knoten" ist die Häufigkeit bösartiger Veränderungen mit etwa 3 % niedrig. Ggf. sind weitere szintigraphische Spezialuntersuchungen sinnvoll.

### Vorteile der Feinnadelpunktion

Gesteigerte diagnostische Sicherheit, Entlastung von Zysten.

### Nachteile der Feinnadelpunktion

Die Zellausbeute erlaubt bisweilen nur eine eingeschränkte Beurteilbarkeit oder kann ggf. als „nicht repräsentativ“ eingestuft werden. Dann wird Ihnen die Wiederholung der Punktion angeboten. Gelegentlich kann sich ein kleiner lokaler Bluterguss (Hämatom) an der Punktionsstelle bilden. Ein solches Hämatom ist meistens ungefährlich und bildet sich in wenigen Tagen zurück. Es seltenes Ereignis ist die operative Behandlung wegen des Blutergusses. Eine lokale Entzündung bzw. Verletzung von Gefäßen oder Nerven sind ebenfalls selten.



## Feinnadel-Aspirationspunktion der Schilddrüse (Patienteninformation und -verständnis)

**Hinweis:**

Sollten Sie an einer Gerinnungsstörung leiden oder gerinnungshemmende Medikamente (Antikoagulantien) wie z.B. Marcumar einnehmen, verbietet sich meist eine Feinnadelpunktion. Bei etlichen anderen gerinnungshemmenden Medikamenten ist nach einem kurzzeitigen Absetzen am Vortag und am Tag der geplanten Feinnadelpunktion eine solche Punktion möglich. Unter Acetylsalicylsäure (Aspirin®) ist die Punktion mit einer feinen Nadel ohne ein vorheriges Absetzen möglich.

**Einverständniserklärung:**

Ich erkläre, dass ich mit der vorgeschlagenen Feinnadelpunktion der Schilddrüse (oder eines Lymphknotens) einverstanden bin.

Dabei können folgende Komplikationen auftreten:

---

---

---

---

**Folgende Fragen sind noch zu beantworten:**

- Besteht eine vermehrte Blutungsneigung selbst bei kleinen Verletzungen oder nach Zahnziehen?  nein  ja
- Nehmen Sie gerinnungshemmende Mittel ein? (z.B. Marcumar®, Xarelto®, Plavix®, Aspirin®, andere)  nein  ja

Ich bin über die Bedeutung und mögliche Komplikationen dieser Untersuchung unterrichtet worden.

Ich habe die Aufklärung inhaltlich verstanden und habe dazu keine weiteren Fragen.

Ich benötige keine weitere Bedenkzeit.

Köln, den .....

.....  
(Unterschrift des Patienten  
bzw. der Sorgeberechtigten)

.....  
(Zeuge/Dolmetscher)

.....  
(Arzt)