



## Schilddrüsen-MIBI-Szintigraphie (Patienteninformation)

Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient,

bei Ihnen soll eine spezielle **Schilddrüsen-MIBI-Szintigraphie** durchgeführt werden. Hiermit können Schilddrüsenknoten in ihrer Wachstumsaktivität beurteilt werden.

Sie erhalten eine schwach strahlende radioaktive Substanz in eine Vene injiziert.

Nebenwirkungen oder Allergien wie z. B. bei Röntgenkontrastmittel treten nicht oder äußerst selten auf. Die Strahlenexposition ist gering und entspricht etwa der Hälfte einer Röntgen-CT-Untersuchung.

### **Zeitplan:**

Zeitpunkt der Injektion: \_\_\_\_\_ Uhr.

Beginn der Untersuchung: \_\_\_\_\_ Uhr. (Aufnahmen sofort und nach einer Wartezeit von 1 Std.)

Nach der Injektion nehmen Sie bitte im Wartezimmer Platz, Sie werden automatisch aufgerufen. Es werden Aufnahmen (Szintigraphie, SPECT) von der Schilddrüse angefertigt. Dies dauert etwa 30 – 40 Minuten.

### **Dauer der Untersuchung:**

Ggf. erfolgt eine Punktion der Schilddrüse.

Die Gesamtdauer der Untersuchung beträgt etwa 2 – 3 Stunden.

### **Ergebnis:**

Bei einem normalen Befund der MIBI-Szintigraphie von Schilddrüsenknoten ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Befund gutartig ist und gutartig bleibt, mit etwa 98 % sehr hoch. Eine 100%ige Sicherheit liefert nur die Operation. Bei einem pathologischen MIBI-Befund beträgt die Wahrscheinlichkeit eines bösartigen Schilddrüsenknotens etwa 20 %. Diese nicht allzu hohe Wahrscheinlichkeit reicht aber im Allgemeinen aus, eine Operation zu empfehlen.