

Hinweise zur Einnahme von Immunsuppressiva:

Cyclosporin A – z.B. Sandimmun®, Neoral®

- 4 Stunden Abstand zur Einnahme von Sirolimus
- Möglichst nüchtern, d.h. eine Stunde vor oder 2-3 Stunden nach einer Mahlzeit mit etwas Wasser einnehmen

Tacrolimus – z.B. Prograf®

- Verzichten Sie auf Grapefruitsaft, da er den Spiegel stark beeinflusst.
- Möglichst nüchtern, d.h. eine Stunde vor oder 2-3 Stunden nach einer Mahlzeit mit etwas Wasser einnehmen

Mycophenolat – z.B. CellCept®, Myfortic®

- Keine Kombination mit Antazida

Sirolimus – z.B. Rapamune®

- 4 Stunden Abstand zur Einnahme von Cyclosporin A
- Möglichst nüchtern, d.h. eine Stunde vor oder 2-3 Stunden nach einer Mahlzeit mit etwas Wasser einnehmen

generell:

- Falls Blutspiegelmessungen geplant sind, KEINE Einnahme bis zur Blutabnahme!
- Bitte achten Sie auf ausreichenden Sonnenschutz, wenn Sie Immunsuppressiva einnehmen!
- Ändern Sie NIE ohne Rücksprache mit Ihrem Arzt die Dosis ihrer Medikamente.
- Auch sogenannte "Naturheilmittel" können Wechselwirkungen mit Ihren Medikamenten auslösen. Bitte besprechen Sie auch solche Therapieformen mit uns.