



Aktuelle TNM Klassifikation der UICC

T-Primärtumor

Tcis	Carcinoma in situ
Ta	nichtinvasives verrucöses Karzinom
T1a	invasiv wachsender Tumor mit Infiltration des subepithelialen Bindegewebes, ohne lymphovaskuläre Infiltration, kein G3/G4
T1b	invasiv wachsender Tumor mit Infiltration des subepithelialen Bindegewebes, Lymphovaskuläre Infiltration oder G3/G4
T2	Tumor infiltriert Corpus spongiosum, mit oder ohne Infiltration der Urethra
T3	Tumor infiltriert Corpus cavernosum, mit oder ohne Infiltration der Urethra
T4	Tumor infiltriert Nachbarstrukturen

N-Regionäre Lymphknoten

pN0	keine inguinalen tumorösen Lymphknoten
pN1	ein oder zwei befallene unilaterale Lymphknoten
pN2	>2 uni/oder bilaterale mobile inguinale Lymphknoten
pN3	fixierte inguinale Lymphknotenpakete oder pelvine LK uni/oder bilateral

pN-Lymphknoten (Pathologische Klassifikation)

pN0	keine tumorösen Lymphknoten
pN1	ein befallener unilateraler Lymphknoten (intranodale Tumorausbreitung)
pN2	multiple und/oder bilaterale inguinale Lymphknotenmetastasen
pN3	pelvine Lymphknotenmetastasen oder extranodale Tumorausbreitung in inguinalen Lymphknoten

M-Fernmetastasen

M0	Keine Fernmetastasen
M1	Fernmetastasen