



Impfempfehlung für die Hämatologie und Onkologie

Patienten und Patientinnen nach allogener Stammzelltransplantation

Impfung Saisonal	Abstand zu alloSZT	Erläuterung	In Impfpass eingetragen
Covid-19	Ab Monat 4-6	› Impfen Grundimmunisierung (3 Impfungen) plus bis zu 5 Booster je nach Antikörper-Titer (SARS-CoV-2 Trimeric Spike IgG) jeweils im Abstand von 4 Wochen › Nationale Empfehlungen beachten	
Influenza	Ab Monat 4-6	› Impfen Jährlich (präferentiell im Sep./Okt.)	
RSV	Ab Monat 4-6	› Impfen (>60 J, einmalig) Kostenübernahme mit Krankenkasse klären sofern PatientIn < 60J ist	

Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient,
Ihr erhöhtes Infektionsrisiko kann durch Impfungen gesenkt werden. Diese Karte zeigt, welche Impfungen wir Ihnen empfehlen.

Besprechen Sie sich mit Ihren Ärzten und Ärztinnen. Diese beraten Sie gerne, prüfen Ihren Impfschutz und führen eventuell fehlende Impfungen durch, damit Sie optimal geschützt sind.



Centrum für Integrierte Onkologie
Aachen Bonn Köln Düsseldorf



Schwerpunkt
klinische
Infektiologie



Impfempfehlung für die Hämatologie und Onkologie

Patienten und Patientinnen nach allogener Stammzelltransplantation

Impfung Standard	Grundimmunisierung zu alloSZT (Monate)					Erläuterung	In Impfpass eingetragen
	6	7	8	18	24		
Pneumokokken	X					› Impfen mit PCV20	
Herpes Zoster (Shingrix)	X		X			› Impfen Wenn seit 6 Monaten ohne Zoster Einmalige Booster-Impfung nach 2 Monaten	
Hepatitis B	X	X	X	X			
Haemophilus influenzae	X	X	X	X			
Diphtherie Tetanus Pertussis Poliomyelitis	X	X	X	X			
Mumps/Masern/Röteln					X	› Titer bestimmen	

Achtung: Bei akuter Abstoßung oder unter immunsuppressiver Therapie vor Impfung bitte Rücksprache mit der KMT-Ambulanz