



Impfempfehlung für die Hämatologie und Onkologie

Patienten und Patientinnen nach autologer Stammzelltransplantation

Impfung Saisonal	Abstand zu autologer SZT	Erläuterung	In Impfpass eingetragen
Covid-19	Saisonal ab Monat 3	› Impfen Grundimmunisierung (3 Impfungen) plus bis zu 5 Booster je nach Antikörper-Titer (SARS-CoV-2 Trimeric Spike IgG) jeweils im Abstand von 4 Wochen › Nationale Empfehlungen beachten	
Influenza	Saisonal ab Monat 3	› Impfen Jährlich (präferentiell im Sep./Okt.)	
RSV	Saisonal ab Monat 3	› Impfen (> 60 J, einmalig) Kostenübernahme mit Krankenkasse klären sofern PatientIn < 60J ist	

Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient,
Ihr erhöhtes Infektionsrisiko kann durch Impfungen gesenkt werden. Diese Karte zeigt, welche Impfungen wir Ihnen empfehlen.

Besprechen Sie sich mit Ihren Ärzten und Ärztinnen. Diese beraten Sie gerne, prüfen Ihren Impfschutz und führen eventuell fehlende Impfungen durch, damit Sie optimal geschützt sind.



Centrum für Integrierte Onkologie
Aachen Bonn Köln Düsseldorf



Schwerpunkt
klinische
Infektiologie



Impfempfehlung für die Hämatologie und Onkologie

Patienten und Patientinnen nach autologer Stammzelltransplantation

Impfung Standard	Grundimmunisierung zu autoSZT (Monate)				Erläuterung	In Impfpass eingetragen
	4	6	12	24		
Diphtherie Tetanus Pertussis Poliomyelitis		X				
Hepatitis B		X			› Wenn Kombinationsimpfung mit Hepatitis A verfügbar, dann gemeinsame Impfung	
Haemophilus influenzae		X				
Pneumokokken		X			› Impfen mit PCV20	
Herpes Zoster (Shingrix®)	X	X			› Impfen Wenn seit 6 Monaten ohne Zoster	
Meningokokken (ACWY + B)			X			
Mumps/Masern/Röteln				X	› Titer bestimmen Impfen, wenn Titer zu niedrig	

Nach einer autologen SZT sollten alle Impfungen aufgefrischt werden, da der vorherige Schutz meist verloren geht