



Impfempfehlung für die Hämatologie und Onkologie

Patienten und Patientinnen nach CAR T Zellen und/oder Bispezifischen Antikörpern (BSAK)

Indikations-Impfung*	Zeitpunkt		Indikation	In Impfpass eingetragen
	BSAK	Car T Zellen		
Diphtherie, Tetanus Pertussis, Poliomyelitis	Impfung unter Therapie möglich, aber nicht empfohlen**	Impfung ab 3 Monate nach Therapie möglich	› Geimpft? Vor >10 Jahren: Impfung wiederholen › Ungeimpft? Impfen	
Hepatitis A/B			› Wenn Impfstatus inkomplett oder Auffrischung erforderlich › Impfen bei Anti-HBs <100 IE/L	
Mumps/Masern/Röteln	CAVE: Lebendimpfung (Kontraindikation unter Therapie)		Einmalig 24 Monate nach Therapie-Ende je nach Titer	

Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient, Ihr erhöhtes Infektionsrisiko kann durch Impfungen gesenkt werden. Diese Karte zeigt, welche Impfungen wir Ihnen empfehlen. Besprechen Sie sich mit Ihren Ärzten und Ärztinnen. Diese beraten Sie gerne, prüfen Ihren Impfschutz und führen eventuell fehlende Impfungen durch, damit Sie optimal geschützt sind.

*Allgemeine Empfehlung unabh. von Grunderkrankung: Bei besonderen Risikokonstellationen, bspw. Asplenie, gelten gesonderte Empfehlungen

** Wenn möglich VOR Therapiestart oder ab 3 Monate nach Therapiestart



Centrum für Integrierte Onkologie
Aachen Bonn Köln Düsseldorf



CIM
Centrum für
Infektionsmedizin

Schwerpunkt
klinische
Infektiologie



Impfempfehlung für die Hämatologie und Onkologie

Patienten und Patientinnen nach CAR T Zellen und/oder Bispezifischen Antikörpern (BSAK)

Impfung	Zeitpunkt			Erläuterung	In Impfpass eingetragen
	Saisonal*	Standard	Abstand zur Therapie**		
COVID-19	X		Ab Monat 3	› Impfen Grundimmunisierung (3 Impfungen) plus bis zu 5 Booster je nach Antikörper-Titer (SARS-CoV-2 Trimeric Spike IgG) jeweils im Abstand von 4 Wochen › Nationale Empfehlungen beachten	
Influenza	X		Ab Monat 3	› Impfen Jährlich (präferentiell im Sep./Okt.) Booster nach 4 bis 6 Wochen möglich	
RSV		X	Ab Monat 3	› Impfen (>60 J, einmalig) Kostenübernahme mit Krankenkasse klären sofern PatientIn < 60J ist	
Pneumokokken		X	Ab 3 Monate möglich	› Ungeimpft? Impfen mit PCV20 › Geimpft mit PPSV23 oder PCV13? Impfen mit PCV20	
Herpes Zoster (Shingrix®)		X	Ab 3 Monate möglich	› Ungeimpft? Impfen, wenn seit 12 Monaten ohne Zoster. Einmalige Booster-Impfung nach 2 Monaten	

*Impfung unter Chemo-/Immuntherapie generell möglich, jedoch nicht in Neutropenie (ANC <500) empfohlen

** BSAK: Wenn möglich VOR Therapiestart oder ab 3 Monate nach Therapiestart